

ประชาสัมพันธ์ ธรณกรป้องกันโรคไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก

อาการ

1. ไข้สูงลอย

39 - 40 องศา ประมาณ 2-5 วัน

2. อาการเลือดออก

เลือดกำเดาไหล อาเจียน ถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว
เลือดออกตามไรฟัน

3. อาการตับโต

กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

4. ภาวะช็อก

เกิดช่วงไข้ลด ปวดท้องมาก กระสับกระส่าย ชีพ อาเจียนหรือ
ถ่ายเป็นเลือด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำ

การรักษา

เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ

กินยาลดไข้ชนิดพาราเซตามอล
ห้าม ใช้น้ำแอสไพรินเด็ดขาด

ดื่มน้ำ หรือน้ำเกลือแร่บ่อยๆ

หากมีไข้เกิน 3 วัน หรือมีอาการช็อก
ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

เกิดจากไวรัสเดงกี โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ
ระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงลายไปกัดคนอื่น
ก็จะปล่อยเชื้อไปยังผู้ที่ถูกกัด โดยระยะฟักตัวในคนประมาณ 5 - 8 วัน
(สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน)
ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้

3 เก็บ ป้องกันได้

1. เก็บน้ำ



เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้ง
หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ

2. เก็บขยะ

เก็บขยะและเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

3. เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้
ยุงลายอยู่อาศัย



ประชาสัมพันธ์กรุงเทพ @pr_bangkok



สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. @prbangkok

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

และศูนย์ไข้เลือดออก กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน